

ປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ

ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານຂອງທ່ານ

- ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສີເກົ່າ ຫຼື ສີລອກ
- ລ້າງມືຂອງລູກ ແລະຂອງຫຼິ້ນເລື້ອຍໆ
- ໃຫ້ລູກກິນອາຫານແລະຂອງຫວ່າງທີ່ມີປະໂຫຍດທຸກມື້ ແລະຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ເຂົ້າໜົມຫວານແກ່ເດັກ

ໃນເຮືອນແລະນອກເຮືອນຂອງທ່ານ

- ເກັບມ້ຽນເຮືອນຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດ ແລະບໍ່ມີຂີ້ຜຸ່ນ
- ຢ່າຂັດສີດ້ວຍກະດາດຊາຍ, ເຊັດຖູແຫ້ງ, ລ້າງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ລອກຫຼືທາສີດ້ວຍເຄື່ອງຟື້ນຊາຍເວັ້ນແຕ່ວ່າ ມັນໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວແລະພົບວ່າບໍ່ມີສານຂີ້ກົວປະປົນຢູ່ໃນນັ້ນ
- ປົກຄຸມຂີ້ດິນນອກເຮືອນໃນບ່ອນທີ່ລູກຂອງທ່ານຫຼິ້ນ
- ຖອດເກີບອອກ ແລະເຊັດເກີບເທິງພົມໜ້າປະຕູກ່ອນເຂົ້າມາໃນເຮືອນ
- ປ່ຽນເສື້ອຜ້າແລະເກີບໃນເວລາເຮັດວຽກແລ້ວ, ແລະລ້າງ ຫຼື ອາບນ້ຳກ່ອນເຂົ້າໄປໃນລົດ ຫຼື ກ່ອນກັບເຮືອນ ຖ້າວ່າທ່ານເຮັດວຽກກັບສານຂີ້ກົວ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຊື້ແລະນຳໃຊ້

- ຫຼີກເວັ້ນການນຳໃຊ້ຈານແລະໝໍ້ທີ່ເກົ່າ, ເພພັງ, ຫຼື ບູຮານ, ຈາກຕະຫຼາດລາຄາຖືກ ຫຼື ຕະຫຼາດຟລີມາເກັດ, ຊຶ່ງເຮັດຈາກແກ້ວໃສ, ເຮັດດ້ວຍມື, ຫຼື ຜະລິດນອກສະຫະລັດ ເວັ້ນແຕ່ວ່າເຄື່ອງໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກກວດສອບເບິ່ງແລ້ວ ແລະບໍ່ມີສານຂີ້ກົວປະປົນ.
- ຢ່າໃຊ້ຢາປິ່ນປົວ ເຊັ່ນ ຢາອາຊາຄອນ (azarcon), ເກຕາ (greta), ຫຼື ເພລອາ (pay-loo-ah) ຢາປິ່ນປົວບາງຢ່າງທີ່ມາຈາກປະເທດທາງຕາເວັນອອກ, ຢາຈີນ, ແລະຢາປິ່ນປົວອື່ນໆ ຍັງອາດມີສານຂີ້ກົວດ້ວຍ. ຂໍໃຫ້ປຶກສາກັບໝໍຂອງທ່ານກ່ອນນຳໃຊ້ຢາໃດໆ.
- ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າພື້ນເມືອງບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ໂຄລ (kohl), ເຊີມາ (surma), ຖືກພົບວ່າມີສານຂີ້ກົວ.
- ຫຼີກເວັ້ນອາຫານແລະເຄື່ອງເທດທີ່ມີສີສົດ, ເຊັ່ນ ແມງຕັກແຕນ ແລະຂີ້ໝັນ, ທີ່ຄອບຄົວແລະເພື່ອນຂອງທ່ານນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
- ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຫຼິ້ນ ຫຼື ອົມເຄື່ອງເພັດ, ສິ່ງທີ່ໃຊ້ຖ່ວງນ້ຳໜັກໃນການຕຶກປາ, ຫຼື ລູກກະສຸນ ຫຼື ປອກກະສຸນ.



ນິສານຂີ້ກົວ ຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ລອບໆ ເຮືອນຂອງທ່ານບໍ່?

ສານຂີ້ກົວສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນຫຼາຍໆ ບ່ອນພາຍໃນ ແລະພາຍນອກເຮືອນຂອງທ່ານ.

ສານຂີ້ກົວສາມາດເຮັດອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້. ສານຂີ້ກົວສາມາດທຳລາຍສະໝອງຂອງເດັກໄດ້. ພິດຈາກສານຂີ້ກົວສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮຽນຮູ້, ບໍ່ມີສະມາທິ ແລະມີບັນຫາດ້ານການປະພຶດ. ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍທີ່ຖືກພິດຈາກສານຂີ້ກົວຈະບໍ່ເບິ່ງຄືວ່າເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈັບປ່ວຍ.

ຂໍໃຫ້ຖາມທ່ານໝໍຂອງລູກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການກວດເບິ່ງສານຂີ້ກົວ. ວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ລູກຂອງທ່ານຖືກສານພິດຂີ້ກົວຫຼື ບໍ່ນັ້ນກໍແມ່ນການພາລູກຂອງທ່ານໄປກວດເລືອດເພື່ອທົດສອບຫາສານຂີ້ກົວ.

ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍຮັບການກວດຕອນອາຍຸ 1 ປີ ແລະ 2 ປີ. ເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີ່ອາຍຸກາຍ 2 ປີ ກໍຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄປຮັບການກວດ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ www.cdph.ca.gov/programs/clppb, ຫຼື ໂທໄປທີ່ໂຄງການປ້ອງກັນສານພິດຂີ້ກົວໃນເດັກ (Childhood Lead Poisoning Prevention Program) ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ:

ທ່ານສາມາດພົບເຫັນສານຂີ້ກົ່ວໄດ້....



ໃນສີລອກ



ໃນຍາປິ່ນປົວ ເຊັ່ນ ອາຊາຕອນ (azarcon), ກາຕາ (greta), ຫຼື ເພລູອາ (pay-loo-ah)



ເທິງຜົມ, ຜິວໜັງ, ເກີບ, ແລະເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ໃສ່ເຮັດວຽກ



ໃນລູກກະສຸນບິນ ແລະສິ່ງທີ່ໃຊ້ຖ່ວງນໍ້າໜັກໃນການຕຶກປາ



ໃນຂອງຫຼິ້ນບາງຢ່າງ



ໃນເຄື່ອງເພັດບາງຢ່າງ
<https://dtsc.ca.gov/toxics-in-products/lead-in-jewelry/>



ໃນເຂົ້າໜົມອົມບາງຢ່າງ
www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DFDCS/Pages/FDBPrograms/FoodSafetyProgram/LeadInCandy.aspx



ໃນຂີ້ດິນ



ໃນເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າພື້ນເມືອງ, ເຊັ່ນ ໂຄລ (kohl), ເຊີມາ (surma), ຫຼື ຊິນດໍ (sindoor)



ໃນຖ້ວຍຊາມແລະໝໍ້ບາງຢ່າງ



ໃນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ



ໃນອາຫານ ແລະເຄື່ອງເທດທີ່ມີສີສົດທີ່ມາຈາກນອກອາເມລິກາ