

วัคซีนโควิด-19 และการตั้งครรภ์

วัคซีนโควิด-19 เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการปกป้องคุณและลูกน้อยของคุณ

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปจะเจ็บป่วยรุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคโควิด-19 ระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้:

- ต้องเข้ารับการรักษาทันทีในโรงพยาบาล
- มีปัญหาการหายใจจนอาจทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
- ความดันโลหิตสูง
- ภาวะเลือดออกผิดปกติ
- คลอดก่อนกำหนด
- ทารกตายคลอด
- การเสียชีวิต

ป้องกันตัวเองและทารกในครรภ์ที่กำลังเจริญเติบโตของคุณจากโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีนและบูสเตอร์

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคโควิด-19 คือการฉีดวัคซีนโควิด-19 และบูสเตอร์ให้ครบ วัคซีนโควิด-19 ช่วยลดโอกาสที่คุณจะป่วยหนักหรือต้องเข้ารับการรักษาทันทีในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ องค์กรใหญ่ ๆ ด้านสุขภาพการตั้งครรภ์ทุกองค์กรจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีน

วัคซีนมีความปลอดภัยในทุกช่วงไตรมาสการตั้งครรภ์ และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โปรดพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของคุณ เพื่อสอบถามว่า วัคซีนโควิด-19 และบูสเตอร์ตัวใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และการตั้งครรภ์

- วัคซีนให้ภูมิคุ้มกันแก่คุณ โดยจะสอนร่างกายคุณให้ต่อสู้กับโควิด-19
- หญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะส่งต่อภูมิคุ้มกันไปยังทารกในครรภ์ที่กำลังเจริญเติบโต ดังนั้น ทารกจึงมีภูมิคุ้มกันบ้างแล้วตั้งแต่วันแรกที่เกิด
- หญิงตั้งครรภ์หลายล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างปลอดภัย
- ผลข้างเคียงเป็นเรื่องปกติ คุณอาจมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หนาวสั่น และเหนื่อยล้า โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง หรือหากคุณมีไข้
- ไปที่ [MyTurn.ca.gov](https://www.myturn.ca.gov) เพื่อทำนัดฉีดวัคซีนหรือโทรศัพท์ถึงผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของคุณ



อ่านเอกสารนี้ในเว็บไซต์ของ CDPH

